

Eszméletzavarok

Az eszmélet két összetevője.

1. Éberség
2. Tudat

Éberség – agytörzs (formatio reticularis)

Tudat (tájékozottság, gondolkodás) – agykéreg

Az eszméletzavar kialakulhat gyorsan vagy lassan.

Okai:

a. anatómiai károsodások

- trauma
- thalamuszt roncsoló folyamat
- vérzés
- agyi infarktus
- daganat
- tályog

b. anyagcserezavarok, gócok

- urémia
 - oxigénhiány (hypoxia)
 - alacsony vagy magas vércukorszint
 - gyógyszerhatás (alkohol, barbiturát, nyugtatók, ópiát)
- elektrolit-háztartás zavara

Klinikai tünetek:

Zavartság (desorientáció) – a felszólításokat ismétlésre megérti

nem képes:

- társalgást követni
- helyesen válaszolni a kérdésekre
- felfogni hol van
- döntést hozni
- fontos tényekre emlékezni

Letargia - közöny, érdektelenség a külvilággal szemben, akarat és cselekvőképesség hiány

- orientált, de lassan reagál

Somnolencia - aluszékonyság, ingerekre ébred

Sopor - csak erőlyes ingerekre ébred

Coma - alvásszerű állapot, nem reagál ingerekre

Vegetatív állapot - van alvás-ébrenlét állapot, de nincs tudatában önmagának és a környezetének

Ápolás:

Az ágy fejrészét 30 fokkal megemelve fektetjük.

(javítja az oxigenizációt és a vénás visszafolyást, csökkenti a félrenyelés lehetőségét.)

Allapottól függően neurológiai vizsgálatok. (éberségi szint, pupillák, reflexek, izomerő)

Cardinális tünetek figyelése.

Légutak gondozása (leszívás)

A beteg forgatása (decubitus)